

Lue 1.^o
Lu 2.^o
B

Observation Sur un empyeme purulent
Survenu à la suite d'une pleurésie.

N^o III.

La nommée Costes âgée de dix ans,
demurante rue des fosses Saint Germain l'Auxerrois,
fut attaquée le 18 janvier 1782 d'une
douleur lancinante au côté gauche de la poitrine
avec une toux sèche, un violent mal de tête,
une difficulté extrême de respirer et une fièvre
très vive. je la saignai trois fois du bras dans
l'espace de douze heures et mis en usage tous
les délayans et les antiphlogistiques connus.
La douleur persistant, malgré ces moyens, je
me déterminai à appliquer sur le côté une
emplâtre vésicatoire à l'aide de laquelle je
parvins à la dissiper ainsi que l'oppression.
Quelques jours après la maladie parut terminée.
je fis prendre alors plusieurs minoratifs à la
malade qui me sembloit entrer en convalescence
et je m'applaudissois de leur effet lorsque tout



ARC34
n^o 41

à coup, dans la nuit du 17 au 18^{me} jour de la
maladie, tous les symptômes reparurent avec une
violence infiniment plus grande. M. Doucet d'en
M. qui avoit suivi cette enfant dans les premiers
temps de la maladie fut appelé avec moy. Nous
la trouvâmes dans un état presque désespéré: elle
avoit une fièvre des plus vives, un pouls petit et
fréquent, une toux sèche et continue, le visage
rouge, enflammé, la respiration on ne peut
plus laborieuse et une douleur de côté si poignante
qu'elle ne pouvoit garder d'autre situation que celle
d'être assise sur son lit le corps flechi en avant
et de côté, la tête appuyée sur les deux mains
et celles ci sur les genoux; situation qu'elle con-
serva onze jours, pendant lesquels il survint des
frissons irréguliers, de fréquentes suffocations, et
un oedème qui occupoit principalement la partie
latérale gauche de la poitrine et s'étendoit jus-
ques sur le bras. à cette époque la malade
avoit les yeux enfoncés, les pommettes rouges et
brûlantes; une sueur abondante couvroit la paume
de ses mains et le côté affecté de la poitrine parois-
soit

Déjà avoir subi une ampliation considérable.

La réunion de ces symptômes et de ceux qui les avoient précédés me fit aisément juger qu'il devoit y avoir une collection de pus dans la cavité de la poitrine et qu'il falloit lui donner une prompte issue. j'en fis la proposition mais mon avis ne prévalut pas et l'on déféra à celui de M. Doucet qui prétendit que la maladie étoit une vraie hépatite qui devoit se terminer par une suppuration prochaine: hépatite produite par la métastase d'une humeur psorique qui depuis la naissance de l'enfant couvroit son corps tous les étés; appuyant d'ailleurs son assertion 1^o sur l'analogie très grande qu'ont les maladies du foye avec celles de la peau 2^o sur la couleur grisâtre des matières fécales. Quelque futile que fut son raisonnement et quelque solide que fut celui que je lui opposai, on ne laissa pas d'adopter ses vues curatives; en conséquence on essaya de faire prendre à l'enfant, d'après ses conseils, des demi bains qu'elle ne pût supporter.



On lui fit des fomentations emollientes sur la région
hypochondriaque droite ; on lui donna des lavemens,
et, de deux jours l'un, de légers purgatifs. Ces
Moyens, loin de la soulager, ne firent qu'aggraver
son état qui alla de mal en pis jusqu'au 28 février
que je fus prié de la revoir. J'examinai de nou-
veau le côté de la poitrine affecté et j'y remarquai,
outre l'œdème dont j'ai parlé plus haut et l'ém-
-piation qui me parut énorme, une tumeur de la
grosseur d'un œuf de poule, située au dessous du
sein entre la sixième et la septième des vraies côtes
à deux travers de doigt des cartilages, obéissante
aux mouvemens de la respiration et avec une fluc-
-tuation très sensible. Ainsi la nature, plus sage
que le médecin, s'interposoit pour ainsi dire entre
lui et la malade et exposoit en vain à ses yeux
une Maladie qu'il s'opiniâtroit à méconnoître.
Pour moy à qui elle n'avoit jamais été équivoque
j'insistai de nouveau sur la nécessité de l'opération
de l'empyème et n'hésitai pas à déclarer aux
parens qu'un plus long délai seroit certainement
funeste à leur enfant. Je fus plus heureux cette fois
car

non seulement ils m'en confièrent les soins, mais même ils rejetterent une consultation que je leur avois proposée dans la vue de fixer leur incertitude. je me disposai donc à l'opération après avoir préparé l'appareil convenable. Aussitôt je placai la malade sur son lit, la fis tenir par la garde et sa mere, et après avoir asujéti la peau avec le pouce et le doigt indicateur de ma main gauche je l'incisai ensuivant la direction oblique des côtes et le milieu de leur intervalle. La peau à peine antamée, le pus jaillit avec une force etonnante. je portai le doigt dans l'intérieur de la playe où je trouvai une petite ouverture faite aux muscles intercostaux par l'érosion du pus et dont l'étroitesse ne lui permit pas de pénétrer dans la capacité de la poitrine. je l'aggrandis avec le bistouri, observant de le guider avec le doigt et de couper ces muscles au milieu de l'intervalle des côtes pour éviter d'interessier les artères intercostales. Les muscles ainsi divisés j'introduisis dans la poitrine mon doigt, à l'aide du quel je reconnus la carie d'une portion des trois côtes



correspondantes à la tumeur, la dénudation de plusieurs autres, l'érosion de la plèvre par l'action du pus et le poumon de ce côté qui nagoit dans ce fluide. je retirai plus de deux pintes d'un pus liquide, sanieux et d'une couleur jaunâtre. Il sortit avec beaucoup de siffement je retirai tout à la fois, le bien être et le soulagement que la malade éprouvoit de son évacuation m'encouragerent à la rendre complète et me dispensèrent de déferer aux préceptes contraires données par quelques auteurs. En effet: loin d'éprouver aucune foiblesse elle n'en acqueroit que plus de forces. L'évacuation étant achevée, j'introduisis une bandelette de linge effilé dans la cavité de la poitrine: j'en couvris l'ouverture d'un morceau de linge fin sur lequel je placai une quantité suffisante de charpie et couvris le tout de compresses quarrées et d'un bandage de corps soutenu par un scapulaire. je fis coucher l'enfant sur le côté malade pour favoriser au pus une issue continuelle; mais ne voulant pas

rester dans cette position gênante elle se mit sur
le dos jusqu'à ce qu'il se fut amassée dans
la poitrine une quantité de pus suffisante
pour gêner sa respiration. Quelque temps
après l'opération je lui fis donner un bouillon
et par dessus, une bonne cuillerée de vin. J'or-
donnai la continuation d'une ptisanne pecto-
-rale dont elle avoit fait usage dans le cours
de sa maladie. À ma visite du soir je la
trouvai très bien; elle respiroit avec facilité,
son pouls étoit très bon, sa toux gluante
et peu fréquente. Je ne crus pas devoir la
panse: j'ordonnai seulement une cuillerée
à café d'oximel simple dans chaque verre
de ptisanne, et une potion pectorale dans
laquelle je fis entrer l'oximel scyllitique.
Toute la nuit suivante elle dormit par inter-
valle;



mais sur les quatre heures du matin elle devint
oppressée ; sa toux étoit sèche et fréquente . La
situation sur le dos lui devenant insupportable elle
reprit alors la position qu'elle avoit avant l'ope-
-ration . à huit heures du matin je la pansai et
retirai au moins un demi septier de pus . je fis
des injections avec la decoction d'orge non mondée
et le miel rosat animée d'un peu d'eau vulnéraire
spiritueuse dont j'augmentai la dose par gradation
; observant d'en laisser une certaine quantité à
chaque pansement que je faisois deux fois par
jour . Le pus étoit toujours en grande quantité
et ne changea de nature qu'au bout de deux
mois , lorsque la face interne de plusieurs côtes
fut exfoliée et la portion des trois autres entièrement
séparée : mais la fièvre lente continue , le dévoïe-
-ment , et l'abondance de la suppuration jetterent
bientôt la malade dans un tel marasme , que son
corps ressembloit à un squelette mouvant recouvert
d'une peau livide et terreuse . je combatis le de-
-voïement par une p'tisanne de ris et de grande
consoude , y joignant quelques prises de diascordium .

Lorsque le devoiement s'arretoit je prescrivois ;
Soit en boisson Soit en lavements, une decoction de quina-
-quina pour combattre la fièvre : remède que je
variais selon le retour du devoiement. Cette combi-
-naison fut couronnée du plus heureux succes .
M. Cabani notre confrere appelle' en consultation
ne changea rien au traitement, mais il conseilla
de donner un peu de nourriture à la Malade, pour
qu'elle pût reparer les pertes considerables qu'elle
faisoit journellement tant par la Surabondance
de la Suppuration, que par la longueur de la
Maladie . Insensiblement elle acquit un peu plus
de force quoique le pus fut aussi abondant
mais sa qualité changea : il devint blanc et
plus lié ; La playe tandoit à se cicatriser, ~~mais~~
Malgré le soin que j'avois d'y introduire un mou-
-seau d'éponge preparée . Voyant que la Suppu-
-ration ne diminuoit pas, et ne pouvant obtenir
de L'enfant qu'elle gardat la position qui eut

pu favoriser l'issue du pus, j'imaginai de faire
une contre ouverture à la partie la plus declive
de la poitrine; Mais les parens ne voulurent
jamais y consentir. Enfin deux mois après comme
elle étoit toujours en même quantité et que je ne
voyois d'autre moyen, qui put conduire à une
prompte guérison, je la leur proposai de nou-
veau. Incertains ils firent appeller une seconde
fois M. Cabani qui confirma mon avis. Avant
d'y procéder nous cherchâmes à nous assurer de
l'état des parties. Ainsi nous introduisîmes la
sonde qui nous fit reconnoître vers la partie
postérieure des adhérences qui nous empêcherent de
la pratiquer, et un trajet fistuleux qui remontoit
jusques vers la face interne et postérieure de la
première vraie côte. Nous abandonnâmes alors
le projet de contre ouverture et nous decidâmes d'en
-tenir

la playe ouverte par le moïen de l'éponge prépa-
-rée ; De Substituer aux injections d'orge miellé
une decoction de plantes Detersives avec l'eau
valneraire , et de faire les pansement toutes les
trois heures jour et nuit . Ces remedes , quoique
j'en eusse varié l'activité , occasionnerent tant
exterieurement qu'interieurement une inflammation
qui m'en fit suspendre l'usage . Pour combattre
ces accidens j'injectai dans la poitrine une
decoction de racine de guimauve , j'appliquai
à l'exterieur des cataplasmes faits avec cette
decoction et moitié mie de pain et farine de
graine de lin et aussitôt l'inflammation dissipée
je repris l'usage de la decoction d'orge . Ce
traitement n'empêcha pas la suppuration d'être
aussi abondante , ni la playe de tendre toujours
à se cicatriser . Pour y remédier je proposai



à M. Cabani de laisser à demeure dans le trajet
fistuleux, une canule d'argent que je fixerois à
la faveur de deux rubans qui entouroient le
corps de la malade, et au moyen de laquelle
je pouvois aisément continuer les injections. Dès
ce moment le pus diminua de jour en jour,
L'enfant reprit assez de forces pour pouvoir
aller un peu se promener et au bout de trois
semaines la suppuration disparut si parfaitement
que je crus pouvoir supprimer la canule.
Dés lors je pansai la playe avec une em-
plâtre de diapsalme, me contentant de faire
quelques petites injections. Depuis quelque
temps la malade étoit aux légumes et aux
fruits rouges pour toute nourriture: je lui con-
servai le même régime. huit jours après

la Suppression de la canule, L'oppression,
la toux sèche, fréquente et autres symptômes
reparurent. La cicatrice se divisa et laissa sortir
une assez grande quantité de pus jaune alk-
-alescent, et d'une odeur si suffoquante que je
fus obligé de faire déshabiller la malade, et
de la changer de chambre pour pouvoir la
panser. je l'injectai, comme à l'ordinaire,
avec une decoction de quinquina à laquelle
j'ajoutai un bon cinquième d'eau de vie camphrée.
je lui fis prendre intérieurement la decoction
seule de quinquina, je fis continuer le même
régime de vie, je fis également augmenter
la quantité des fruits, tantôt cuits, tantôt crus.
je fis mettre beaucoup de plantes chiocées
dans le bouillon gras. Le pus alors chan-
-gea de nature en très peu de temps; il dev-
-int



Louable, diminua de jour en jour, et enfin la plaie se referma totalement un mois apres la rupture de la cicatrice.

Cette Maladie a duré près de huit mois. il est resté à l'endroit de la cicatrice un enfoncement produit par la destruction d'environ trois travers de doigt de la sixieme vraie côte et d'une partie de la cinquieme et de la septieme en comptant de haut en bas. La maladie terminée je mis la malade à l'usage du lait d'anesse pendant six semaines. En peu de temps elle a acquis de l'embonpoint, et a joui jusqu'à ce jour de la meilleure santé. Cette douloureuse maladie la delivra de l'humur à laquelle elle étoit sujette depuis sa naissance.